

TRIAGEM PARA A TUBERCULOSE

Anamnese dirigida	Sim	Não
Tosse produtiva por > 3 semanas		
Febre vespertina		
Sudorese noturna		
Inapetência		
Perda de peso (> 10% do peso ideal)		
Astenia		
Histórico anterior de tratamento para a tuberculose		
Histórico familiar de tuberculose		
Histórico de quimioprofilaxia anterior para a tuberculose		
Contato recente com a tuberculose		

IMUNIDADE ESPECÍFICA CONTRA *M. tuberculosis*

PPD	Teste realizado em: / /	Resultado do teste: mm	Classificação do paciente: <input type="checkbox"/> Positivo (PPD \geq 5 mm) <input type="checkbox"/> Negativo (PPD < 5 mm)
IGRA	Teste realizado em: / /	Valor de referência: Negativo	Resultado do teste: <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

RADIOGRAFIA DO TÓRAX

Exame realizado em: / /	Resultado do exame: <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Imagem suspeita ou sequela de TB <input type="checkbox"/> Compatível com a sequela de TB
--	--

Se o PPD for positivo (\geq 5 mm) e/ ou o RX de tórax mostrar sinais de tuberculose latente, deve ser iniciada a quimioprofilaxia com Isoniazida (300 mg/dia) por 6 meses	PPD	RX de Tórax	Profilaxia TB
	< 5 mm	Normal	Não indicada
	< 5 mm	Sequela de TB	Iniciar a quimioprofilaxia
	\geq 5 mm	Sequela de TB	Avaliação do especialista
	\geq 5 mm	Normal	Iniciar a quimioprofilaxia

Início da quimioprofilaxia: / /